



BURASIL CREMA (APLICACIÓN)

Es una droga tópica para el tratamiento de la Psoriasis, ha estado en el mercado mundial por más de 15 años y los pacientes de psoriasis están reportando satisfacción. Están extremadamente satisfechos y disfrutando un razonable descanso de la Psoriasis.

Burasil es un Tratamiento Tópico y los efectos colaterales ocasionalmente reportados en orden de importancia son: enrojecimiento, en la piel. Normalmente estos efectos colaterales son suaves; y a veces estos son mal interpretados como una mala señal cuando en realidad es un síntoma de que las lesiones sanarán, algunos pocos pacientes interrumpen el tratamiento equivocadamente. La administración del **Tratamiento Burasil** es muy específico y esencial asegurando que un resultado positivo está a la mano. Si esta utilizando cortisona suspéndala paulatinamente.

Pruebas clínicas: Burasil fue probado para una suave a moderada placa de Psoriasis desde 1.997. Es la **Crema, Loción y Revitalizante** tópicos disponibles para el **tratamiento de la Psoriasis**. Pruebas clínicas determinaron que fue efectivo en el mejoramiento de lesiones cuando fue usado como único tratamiento en aproximadamente el 100% de los pacientes de Psoriasis. Estos, reportaron mejorías hasta en un 95% al 100% de las áreas afectadas con desaparición de las placas. Estos estudios también confirmaron que una aplicación al día, trabaja rápido para calmar los síntomas de la Psoriasis, los pacientes notaron mejoría en una semana o más. Muchos pacientes disfrutaron y descansaron de sus lesiones de Psoriasis hasta por (20) semanas después de suspender la medicación, y en algunos casos descansos que duran más de un año han sido reportados.

Un Ejemplo: a continuación una carta que tipifica algunos de los problemas que los pacientes enfrentan y las razones por las que a veces desechan Burasil antes de darle al medicamento oportunidad para actuar:

Queridos Productos Burasil: Apliqué BURASIL crema, mañana, tarde y noche, a mis placas y noté un cambio inmediatos en mi psoriasis. Nunca he usado un producto tan poderoso que produce tales cambios. Las placas empezaron a desaparecer y yo pude extraer enormes tiras de la piel. Las placas levantadas de psoriasis pronto se nivelaron con mi piel regular. Sin embargo, mi piel regular alrededor de la placa se tornó roja, cruda y empezó a formar costras. Regresé a usar BURASIL solo una vez al día. Entonces empecé a experimentar una picazón insoportable. Fue imposible evitar arrancar todos los "cueritos" (capas secas de la piel). Después me di cuenta que me estaba dando psoriasis en la piel normal al rededor, ahora dañada, probablemente debido a rascarme y quitar las capas (fenómeno Koebner). Deje de usar BURASIL aunque mi psoriasis estaba muy diferente, plana y roja en lugar de abultada con capas gruesas de escama blanca.
Cordialmente, J. D. Sao Paulo.

Respuesta: **Burasil** crema nunca se aplica "libremente". De hecho una cantidad de crema del tamaño de una lenteja es suficiente para cubrir la lesión del tamaño de 3-4



centímetros cuadrados. El medicamento es completamente frotado dentro de la lesión sin dejar ningún residuo. Debe estar contenido dentro de la placa de psoriasis y nunca esparcido sobre la piel normal del rededor. Puede usarse un (copo de algodón). Si el medicamento se esparce sobre la piel normal, la crema de exceso puede ser lavada con agua.

Aunque es comprensible el entusiasmo de una persona por liberar su piel de la Psoriasis, “mañana, tarde y noche” nunca sería una posología (aplicación) apropiada para el tratamiento con BURASIL. Debe ser aplicada una vez al día y al rededor de treinta minutos antes de ir a la cama y no contaminar otras áreas de la piel durante la noche. Alternativamente puede usarse una crema hidratante o emoliente por la mañana treinta minutos antes de vestirse. La única manera de evitar este estado “rojo y crudo” es mantener BURASIL donde él pertenece – sobre la placa de psoriasis.

Un rasgo único de BURASIL es su habilidad para causar un “Erythema”. (Enrojecimiento) Esto significa que la placa de psoriasis se torna roja antes de desaparecer. Esto puede producir pánico y confusión al paciente de psoriasis pues el objetivo de la terapia no es el enrojecimiento. Esta no es una reacción anormal y eventualmente la lesión desaparecerá. Así como después de desaparecer las placas pueden quedar color café por un tempo corto, para luego tornar a la normalidad.

Los pacientes pueden ser más propensos a “rascar y arrancar” cuando están usando BURASIL e inconscientemente causar una reacción “Koebner”. El fenómeno “Koebner” ocurre cuando las lesiones psoriasis aparecen al lado de trauma a la piel. El trauma de la piel puede originarse del rascarse y arañarse, pues BURASIL puede causar irritación y piquiña inicial 2 a 3 minutos pues esta actuando. Si los pacientes sienten los típicos signos de incomodidad un médico debe chequearlo. Una aplicación diferente del tratamiento, como usarlo día de por medio, o una dosificación diferente puede ser conveniente. Es importante que los pacientes recuerden **evitar rascarse**.

Recomendaciones:

- Aplique una fina capa de **Burasil** crema a sus placas de psoriasis una vez al día.
- Aplique **Burasil** solo a la placa de Psoriasis.
- No aplique demasiado **Burasil** crema.
- Evite esparcir **Burasil** sobre la piel normal y asegúrese de dejar la crema secarse al aire libre antes de acostarse (aproximadamente 30 minutos).
- Si usted toma un baño antes de aplicar **Burasil**, asegúrese de que su piel este absolutamente seca.
- No cubra las placas de psoriasis tratadas con ropa o vendas.
- Si su piel normal entra en contacto con **Burasil** lávela inmediatamente.
- Lave sus manos después de aplicar **Burasil**. Evitara esparcir **Burasil** en piel normal o los ojos.

BURASIL loción puede ser usado sobre el cuero cabelludo y alrededor de la línea del cabello. El medicamento será aplicado sobre el cuero cabelludo seco y se le debe permitir secar completamente antes de ir a la cama. Esto minimizará la posibilidad de que BURASIL Crema se esparza sobre la cara u otras áreas del cuerpo. BURASIL



Crema debe ser usado con prudencia, sobre los genitales, o áreas de la piel, como; por ejemplo, axilas, pliegues en la ingle o debajo de los senos.

Regularmente, las primeras dos o tres semanas de uso de BURASIL son las más cruciales. Aquí es cuando los pacientes experimentan las reacciones más intensas al medicamento y encuentran difícil figurarse qué está pasando. Usted debe decidir el uso de una dosis más baja del medicamento o cambiar el régimen del tratamiento. Este pendiente de cualquier reacción adversa.

Conclusiones:

- Cuando use un emoliente o, una crema hidratante sobre su placa de Psoriasis, aplique BURASIL crema solo después de que usted esté seguro de que no hay residuos de cremas o lociones sobre la placa de psoriasis. Aplicar BURASIL sobre una capa aún húmeda de crema o loción puede esparcir inadvertidamente el medicamento hacia la piel normal de los alrededores.
- Aplique una pequeña cantidad de Crema sobre la placa de Psoriasis para crear una fina capa. Usar BURASIL más de dos (2) vez al día no es necesario. Esto **NO** proveerá un resultado más rápido o mejor y puede incrementar el riesgo de enrojecimiento, despellejamiento de la piel o incomodidad.
- Usted puede experimentar ardor y sensación de quemadura por 2 o 3 minutos después de aplicar BURASIL crema. Ocurre ya generalmente el paciente se a rascado y arañado. Esto ocurre con menos frecuencia a medida que su piel se acostumbra al medicamento. Si estas sensaciones no desaparecen aplique la crema un día de por medio o alterne su uso con una crema hidratante.
- No reemplace una aplicación si olvido alguna, simplemente retorne a su programación de aplicaciones normal tan pronto como sea posible.
- Las placas de Psoriasis pueden tornarse rojas antes de desaparecer. Esté atento a saber distinguir este enrojecimiento de una irritación inducida por BURASIL.